

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais et du Razès.

N° 3 du 24 Février 1988

COLZA

Charançons de la tige C.Napi.

Ce ravageur est en pleine activité dans la vallée de la Vixiège et la région de Salles sur l'Hers (déjà signalées dans notre bulletin N° 2). On peut observer ces charançons sur les tiges du Colza, ainsi que de nombreuses piqures de pontes et nutritionnelles, de jeunes larves sont déjà présentes en particulier dans la région de Salles sur l'Hers, nous renouvelons donc notre conseil de traitement pour cette zone, ainsi que pour la vallée de la Vixiège et la région de Belpech.

Les Colzas sont encore au stade sensible. Dans les situations concernées:

Traitez dès que possible à l'aide d'une des solutions suivantes :

- DECIS..... 0,3 L/ha
- KARATE..... 0,15 L/ha
- METHYL BLADAN..... 0,9 L/ha

Pour les autres régions le risque est peu important : Ne pas traiter.

CEREALES

DLE D'HIVER :

- Maladies du Pied : R.A.S.
- Rouille Brune : Présente dans toutes les situations, son évolution future dépendra des conditions climatiques du mois de Mars.
Aucune intervention n'est à faire pour le moment.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



ORGES D'HIVER :

La plupart des cultures sont infestées d'oïdium, la Rouille Naine est presque toujours, déjà présente, les premiers symptômes d'Helminthosporiose ont été observés en quelques lieux, les orges sont en moyenne au stade 5 (cf planche échelle de Feekes ci-joint), si les conditions sanitaires et climatiques actuelles persistent nous vous conseillons de traiter ces cultures dès le stade 6 (premier noeud de la tige principale visible, à l'aide d'une des solutions suivantes :

- TILT. E. 1 L/Ha
- IMPACT RM. 1 L/Ha
- CORVET CM. 4 Kg/Ha

POIS PROTEAGINEUX :

- Mildiou : Nous n'observons pas d'évolution de ce champignon pour le moment, cependant la vigilance s'impose de nouvelles attaques restent possible.


Ne pas traiter pour le moment :

Le complexe maladie du pois va évoluer en fonction des conditions climatiques à venir, avec pour dominante soit le Mildiou, soit l'Anthracnose.

Nous vous tiendrons régulièrement informé.

(Tirage du 24 Février 1988 - 1600 exemplaires)

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1988 - S.P.V.




STADE DE DEVELOPPEMENT DU

BLE

ECHELLE DE FEEKES

D'après E.C. Large



D. D. A. F.
Service
de la Protection des Végétaux
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél. 68 71 18 58

